

3 950 La circulation du sang metant que
mécanisme par lequel le sang est porté
du coeur aux parties et revient les mêmes
parties vers le coeur du côté par
conséquent des tuyaux qui peuvent
remplir ces deux fonctions c'est à dire
celle du transport et celle du retour
Le tuyau par lequel le sang va du
coeur vers les parties s'appellent artères
Celles au contraire qui l'exportent
des parties au même coeur portent le
nom de veines je remarque au reste
que tous les tuyaux artériels qui se distribuent
dans toutes les différentes parties ont
leur principe dans deux gros troncs dont
l'un va du ventricule droit et porte
le nom d'artère pulmonaire l'autre qui
est le plus considérable sort du ventricule
gauche et se nomme l'aorte je
remarque de même que tous les tuyaux
veineux qui ont leur principe dans
les différentes parties du corps vont aboutir



à deux gros trous dont l'un finit au ventricule
gauche et répond à l'artère nommée pulmon^{aire}
l'autre trou qui finit le second aboutissant
commun finit au ventricule droit ou luy a
comme le nom de vaine caue qui répond
pour les racines à toutes les extrémités
de laorte il faut présentement examiner
Chacun de ces gros tuyaux je commenceray
par les artères et finiray par les vaines
L'artère pulmonaire sortant du ventricule
droit du cœur jette des divisions qui respon-
dent au nombre des lobes du p^{re}mon
cœur on en trouve d'abord deux un droit
et l'autre gauche elle se fourche aussy dans
ces deux directions chacun des deux lobes
étant composé d'autres lobes plus petits
et ces petits plus petits d'autres qui en ont
encore d'auantage les deux premiers vaine
d'artères se divisent d'abord en pareil
nombre d'autres vaineau qui entre des lobules
dans la composition de deux gros lobes
et les vaineau des lobules jettent ces
divisions qui répondent au nombre des
lobules qui composent ceux qui leur ont
un peu plus grand loy coanais par ce moyen
que l'artère pulmonaire va aboutir dans tous

les comptes de la subitance des pannes les
anatomistes non point donne de nom
aux differentes ramifications de l'artere
pulmonaire par consequent n'ayes
besoin d'une plus grande description

Laorte sortant du ventricule gauche
du coeur forme un canal d'un diametre
tres considerable le quel endes valvules
sigmoïdes jette quelque fois une ou deux
petites arteres qui a l'amee se perdent dans
la substance du coeur portent le nom
d'arteres pulmonaires coronaires le Gros
tronc faisant quelque chemin sans
division decrit au cours d'une autre loy
a donne le nom

De laorte pte conuexe
cette courbe regarde les ptes inferieures
et la conuexe est tournée vers la teste du
milieu de cette conuexité il part trois
gros vaisseaux auxquels on donne le nom
laorte ascendant le canal total apres
auoir jette la croûte descendante et va
former laorte descendante abandonne
cette dernière pour suivre la première
division

Laorte ascendant est composé d'un
truncus ou milieu et d'un latéral



moelle doit selon la direction du cote
gauche en forme d'excavation gauche —
le lateral doit monter jusques a la
fontaine de la clavicule vers laquelle
il s'avance vers ces endroits en jette
deux rameaux un exterieur et l'autre
interieur le dernier forme la Perotis.
Droite exterieure la clavicule droite
le rameau lateral gauche monte
un peu obliquement vers le niveau
de la clavicule et fait ensuite trainant
vers la selle la Souclavie gauche
la Souclavie avert de passer dans la
fente du muscle Pealene jette plusieurs
rameaux dont la mammaire interne
l'intercostale Super. la vertebrale
et la musculaire

La mammaire descend inferieurement. Sous
le Cartilage des cotes et jette dans les entre
deux deux rameaux qui se portent exterieurement
ceux qui se portent a la situation des
mamailles pour se perdre dans les glandes
de cette partie pour leur le lait s'écoule
fourrir en descendant des rameaux aux
mediastins qui font les medastines il
glisse ensuite dans la substance du

grand d'voir se porte jusque vers son
milieu dans l'air ou finit le p^{er}ost^{er}
avec que les rameau de laquelle ils
se anastomisent

L'artere Costale Supérieure fournit
du sang aux p^{er}tes qui se trouvent à l'élargissement
des 4 premières arêtes costales elle se divise
en 4 rameau dans chaque p^{er}ost^{er} de
l'élargissement en tous sens comme celle du
seul rameau que je vois se diviser
et qui se partage en branche en l'air et
post^{er}. et Spinale Antérieure Sup.
La veine Costale se divise et fournit
en l'air et aux p^{er}tes qui y sont couchées
la postérieure donne aux muscles qui y
sont situés aux costales et sur le Corps
des Épines des vertèbres de ces endroits
La Spinale entre par le trou creux
dans les entre deux des vertèbres et
se divise en rameau ant^{er}. et post^{er}.
pour fournir à l'épine des branches
à l'artere Costale passe par le trou
des apophyses transverses du Col
et monte de cette manière dans le thorax
où l'on observe que dans les p^{er}tes de deux
apophyses transverses elle jette des branches



dans l'une en entér. l'autre postér. et la
troisième spinale l'inter. Donne aux
muscles de devant la postér. ceux de
derrière et la spinale alpine com.
Ces rameaux de l'intercostale Super.
le reste du tronc fait un contour
pour suivre un rameau qui va à la
partie postér. de la pharynx oblique
abundante de la première vertèbre
du Col et entre par le trou spinal
dans le crâne en suite le canal
du côté droit se joint avec celui
du côté gauche pour former un tronc
commun avec des rameaux de la carotide
interne au dessous de la moelle allongée
après l'union il se détache un
rameau de chaque côté qui s'insinue
avec qu'on s'en semble faire le commencement
de l'artere spinale entér. il se détache
encore d'autres pour donner au cerveau
et la moelle allongée alpine dans
cette action se divise la musculature
se divise en rameaux Super. et infer.
Donne aux parties Super. et infer. du
devant et du derrière du col
La Carotide monte couchée sur le corps

des vertebres qui se prolongent a la situation
jusques aux laryns sans faire aucune
division Sy nous en exceptons une petite
au lieu quelle donne thymus qui par cette
raison porte le nom de thymique
vers le laryns elle donne quelque rameau
a la trachee aux glandes hyoides
et aux muscles qui y sont logez apres
quoy elle se divise en deux gros
vaisseaux dont l'un la quelle carotide
interne et l'autre carotide externe

La Carotide interne entre dans le
crane par la seconde fente irreguliere
et se divise a la base du cerveau
elle jette trois branches une entree et
l'autre moyenne et la troisieme poster.
laulv. donne au lobe entree du grand
cerveau aux parties qui le composent
et a l'oeil la moyenne fournit a l'apex
moyenne et enfain la poster. ou lobe
poster. du grand cerveau auquel elle
donne un infinité de rameaux apres
quoy le rameau d'un cote se joint
avec celui de l'autre pour faire un
canal commun avec les deux vertebres



jointes de mefme auquel on donne
le nom d'autre carotide qui fait
la communication mutuelle des 2
de ces 4 vaisseaux

La Carotide externe se divise en 3
en trois branches recenter. l'autre
moyenne et la troizieme poster. le
vaisseau inter. se divise luy mefme
en super. et en infer. le dernier donne
aux muscles de la larynx et du
larynx aussy bien qu'alors que on
il forme les vaisseaux super. fournis
aux muscles mulloides digastrique
et paucier et traversent la base de
la machoive il donne aux lèvres et
au vest de la face il jette mefme une
branche qui va dans l'oeil pour
l'anastomose avec une des ramifications
de la carotide inter. dont il exporte

Le vaisseau majeur s'avance vers
l'angle de la machoive infer. et jette
une branche qui entre dans l'os condan-
citrane ensuite se divise en deux
portions l'une fait la lèvre de la dune
membre avec d'autres dans le crâne par
le trou carotide donne des vaisseaux

alalutle ^{quelque} ~~aux autres~~ muscles et
aux autres petits du grand palais
et du voisinage etant en fait avine
dans le crane elle glisse dans la substance
de la dure mere pour former la feuille
de figuier pour certaines branches
pourvus immediatement pour les
longitudinal et d'autres parties jusqu'
au diploe

L'artere temporale donne des rameaux
anciens et anciens de la veille
autour du front et en un mot toutes
les parties inter. et exterieures de la tete

La Branche poster. de la carotide exte.
donne tous les extenseurs et fléchisseurs
de la tete et du col de la peau qui
les couvre et en fait autour les petits
qui sont a l'exte. de la veille de la tete
et du col

La veine jugulaire etant parvenue au corps
du scalaine passe par la fente avec que
les nerfs et quitte en sortant de ce point
pour aller pour prendre celui de la veine
dans le trachee elle donne des rameaux
aux parties voisines qui sont pour
devenir particulieres



Axillaire en fort de la fente de
l'axillaire jette 4 branches considérables
qui prennent leur nom des parties où elles
se distribuent j'appelle la première
mammaire externe la seconde thoracique
la 3 souscapulaire et l'autre suscapulaire.
La mammaire externe se distribue
à la partie extérieure du grand de la poitrine
aux ligaments des mammelles et aux muscles
qui répondent à leur situation l'axillaire
fournit des branches à la peau et aux muscles
qui garnissent la partie inférieure de la
poitrine.

La souscapulaire donne des rameaux
axillaires en donne aux aisselles de
moindre considération mais elle jette
sur tout un rameau qui passe par dessous
la testu de la du bras et glisse entre le
longer le cœur donne à leur corps une peau
fournir même des branches au deltoïde
Après axillaire en fait l'aveugle du deltoïde
sans de l'aisselle et prend le nom de
brachiale laquelle donne des rameaux
aux armoiries ou brachial interne et
au biceps qui la couvrent pendant une
partie du chemin quelle fait pour passer

Sous la ponceuse de semelle d'auget
ajette un rameau qui se prend
sur le visage du condyle interne
de l'humérus. Ce tronc arrive à l'apophyse
du condyle jette 4 rameaux à pelleray
luz latéral extér. l'autre latéral
intér le 3^e majeur et le 4^e postérieur

La Branche latérale interne se peut
sur le rayon elle jette d'abord un rameau
qui remonte entre le long supinateur
et le brachial intér. ou il se prend de
donneur de ramification aux tegumens
de condyle externe elle se tang le long du
rayon en fournir de divisions aux muscles
et aux autres jettés qui sont logés sur le
Cordes et tronc arrive vers le poignet
faire l'artère du poutre olécrane d'artère
de laquelle il prend un rameau qui se
prend dans ce muscle l'exte. passe l'os
extenseur du ponce pour servir les
entre deux de ce dernier et de l'indice
et les cotes de ces deux doigts qui se
regardent

Le rameau latéral et intér. ne prend
à la face intér. de l'os du coude. Mais
toute la longueur en fait aux 4 doigts elle
fournir des branches aux muscles



Les autres parties qui se trouvent:
dans cette direction il passe enfans
sur le profane et sur le ligament
annulaire pour arriver a la petite du
tenar qui regarde le petit doigt ou
il fait un demi cercle du partant 4 branches
dans les trois premières donneurs a chaque
côté du doigt qui leur répond
cont. l'annulaire l'annulaire et le doigt
du milieu la 4^e branche garnit le
côté de l'index qui regarde le doigt
du milieu il faut remarquer que ces
rameaux s'anastomosent avec ceux qui
sont a l'extér. de la main et des doigts
La 3^e Branche majeure de la brachiale
gist entre le coude et le rayon sur la
face infer. du ligament qui les unit
et donne aux muscles qui s'y trouvent
logés elle finit a la paume de la
main

La 4^e Branchette ou quatrième par
ce ligament qui joint le coude avec le
rayon et donne aux parties qui sont
a l'extérieur de ce deux os il gist
sur la face extér. du ligament dans

il a été parlé pour arriver à expliquer
ce réseau passe sous le ligament
annulaire et fournit de branches à
tout le voisinage et finit en faisceaux
4 divisions qui donnent au dehors
de l'indice du doigt du milieu de
l'annulaire et de l'auriculaire formant
des distributions à l'ext. de ces fibres
et tout ensemble à celle que la latérale
inter. fournit au dedans.

La Descente de l'Arterie

Laquelle de cette grande ovale dans
il a été parlé forme ce qu'on appelle
communément artère descendante ou artère
qui fournit à toutes les parties qui se trouvent
depuis la base de la 4^e vertèbre du
dos ou en haut jusqu'à la 3^e inf.
à laquelle elle distribue des branches
je viens à l'examen des ramifications
de cet tron il jette d'abord vers l'endroit
où la courbure se redresse en artère
appelée bronchiale ou artère des Bronches
qui s'étend dans la substance des poumons
dans les Bronches et le bas de la trachée.



Laorte descendente jette ensuite
8 artères intercostales qui se perdent
à la hauteur de parait nombre des
côtes infér. chaque deux intercostales
fournissent trois branches ventr.
qui suivent la cavalcure de la cage os-
seuse qui se partage com. les
divisions de l'intercostal supér. &
postér. qui donne deux muscles situés
dans l'entre deux des apophyses
transverses des vertèbres de ces endroits
à leur épines ou sur le court des épines
mêmes l'artère arrive en fin vers le
tendoy du diaphragme entre lequel elle
passe mais auparavant elle fait une
artère qui allant se perdre dans le
diaphragme porte le nom de diaphragm.
ce vaisseau jette pour tout une branche
qui fournit au péricarde à laquelle on
a donné le nom de coronaire

Laorte entraine à travers les tendons
du diaphragme dans la cavité du bas
ventre au cœlum arriéré ellipte
de bord un vaisseau considérable
nommé artère cœliaque dans

Les divisions d'ans trois en nombre
j'appelle la premiere Branche gastrique
la 2 esplenique et la 3 epatique.

La Branche gastrique jette d'abord
un rameau qui se distribue alentour
de l'orifice Sup. de l'estomac dis a
cause de celle coronaire Stomachique
le trom se divise ensuite en deux
Branches latérales l'une adroit l'autre
gauche la gauche fait la gastrique
gauche qui donne a toute la partie
de l'estomac tournée de son costé et
~~la gauche~~ la droite forme la
gastrique de même nom qui fournit
tout a toute la partie de l'estomac
qui la regarde.

La Splénique jette en premier lieu
l'artere appelée peneratique parce qu'elle
se perd dans le peneras le trom auent
ensuite de quelque ligne sans division
et se partage en rameau Sup. et
rameau inf. le premier va a la partie
haut de la rate mais en y venant
il donne une Branche qu'on appelle
fournir a la partie gauche de l'epiploon



en du ventricule à pelle gastrique épiploïque
gauche l'inf. se distribue à la
partie basse de la vante et donne dans
l'avant une petite artère à la partie
gauche de l'épiploïque qui peut elle
même se diviser en d'elles épiploïque gauche
la patique fait un chemin considérable
se divise en deux branches l'une se nomme
de patique supérieure —

La patique vers la base du foie jette
deux petites artères appelées listiques générales
parce qu'elles se distribuent à la vante
du foie le trou entre dans le foie se
divise en autant de branches qu'il y a
de lobes dans le foie et ces premières
en ajoutant que chaque lobe
contient de lobules pour s'y perdre
entièrement.

Intestinal Super. forme un arc au
dessus de l'estomac et se nomme de pilorique
l'autre dans la partie gauche de l'épiploïque
et du ventricule joint ensemble la pelle
gastrique épiploïque dans le ventricule —

terme de cette last. donne la portion
droite de la pipelay sul dans luy vey
ce nom de pipelayque droite parce quelle
regarde ^{ce} celle la dernière brenche
du levete du tronc a distribue dans
le duodenam dans le comancem^t du
jejunum ce qui luy faisoit garder
un nom d'intestinale super. mais
propre au lieu que le canal
epigastrique intestinal superieur
commun



Laorte descendente butinale du corps
des vertebres des lombes jette dans
loucheny d'autre veaiseau qui ne
son que de moindre considon
que celui du ^{du} Ebrucines de tre par le
elle donne de bord au mixentine et aux
parties voisines une grante brenche nomet
meutivique super. c'est de ce canal
que sont toutes les artres appellees
vulgairement mexer aigue les anatomistes
nous donnent des noms que deux des
ramification, mais on pourroit dire qu'il
y en a q^{ui} méritent d'être déterminées

La premiere es appellee intestinale
infer l'autre se nommera l'artere
deliliac la troizieme es ditto caele
es la 4^e auralinum d'artere du colon.

L'intestinale infer. fournit ala
petite du jejunum qui n'ay a pas receu
de la superieure.

L'artere deliliac donne a tous les contom
deurs intestins es aux petites du mésentere
qui les accompagne la caele distribue
dans le boyau namme. cecum

L'artere du Colon fournit a une bonne
partie du colon es aux corps qui l'envirouent

La grosse artere l'est echapper du bagu
dees cottes bien plus d'autre lugeuse arterie
ce premier envang donne a la partie super.
des muscles couchés dans cette direction porte
enam d'artere musculuse super. en descendant
de suite on trouve les Emulgentes les
oreaux des vains il se remarquer que
de ces Emulgentes il en sort une artere
nommee adipeuse qui donne aux capules
abdominales es a la groisse des vains le
vaisseau se joint immediatement.

de la aorte mais dans le L'hyer
il n'y a de la musculature super.
et ny peu aude saux des Emulgentes
ou voir des arteres a peller ~~expos~~
expermaticques qui s'engagent dans
la queue du peritoine sortant par
les anneaux des muscles du bas ventre
pour se pendre dans les testicules
vers le nœud de la dernière vertebre
de lombes et la per. de los saivann
l'artere change de vaulte et passe
sur la vaine caudé en suivant cette
hauteur il sort de la aorte une
artere a peller mesenterique infer.
qui donne a la ptie basse du colon
et au rectum il sort encore une artere
nommée musculature moyenne qui se
distribue dans le milieu des muscles
qui ont déjà vers le haut receu
des branches de la musculature super.
Il faut observer que la aorte de puis
la per. vers le creux des lombes jusque a la
per. du bas se jette dans les pœe moyen comme
a deux creux creux d'arteres de chaque



Cette qu'on appelle lombaire
chaque division de telle
manière que la plus grande
ptie de son canal forme un
rameau spinal entourant
l'annulaire avec ceux des intercostals.
de la colonne le reste se perd
dans les muscles situés au-dessus
et sur le corps des vertèbres des
lombes en fait la artère continue
de la sacrum coule sur la même
cave se fourche et perd son nom
pour prendre celui d'artère iliaque
qui est double à chaque cote
vers la division la artère se divise par
deux en artère qui donne dans
le bas aux pties qui couvrent la
sacrum et forme des arômes qui
passent par les trous des nerfs sacres
donnant à la moelle il y a même des
branches qui se portent en dehors
jusques aux pties situées au-dessous



de la Laevam il abandonne l'artere
pour prendre les iliaques ce que
je diray d'un cote l'artere de veigne
pour l'autre

L'artere iliaque apres avoir fait
environ un pouce de chemin jette un
vaisseau considerable quel anatomistes
apellent hypogastrique ce dernier
canal donne plusieurs branches—
la premiere partant bas du foetus
dans le placenta elle s'appelle
l'artere ombilicale mais par la
ligature qu'on fait a l'enfant de sa
naissance elle ne fait plus de fonction
et devient ligamentuse s'ouvrant adans la
cavite la seconde branche donne
a l'artere et porte le nom de vesiculaire
car se distribue aux vesicules seminales
et adans la cavite dans l'homme
ou la femme par la fontaine interne
dans la femme elle donne adans des
parties de la generation de son sexe
le reste du tronc jette des arteriolles—
la veine qui suit le meme ordre que



La premiere l'arée et fournissent
en descendant. acc. quelle ne donne
pas il y a une inmitte plusieurs rameaux
le premier donne la petite inflex.
et entiere du vecteur et la pelle
femorale elle est extrême a meutre patte
par le trou oculaire et s'end dans
les abducteurs et le triceps la dernière
ramification sans du bassin par les genies
qui est la petite patte. de los des illor
et s'end en branche inter. et
exter. la 1^{re} donne aux quadriceps
ou commencement du biceps et aux
muscles voisins la seconde
distribue au grand et au moyen flexeur
et aux tegumens du dos de la
genie.

La liague s'ouvre sur le coté
du bassin sans faire aucune division
mais ensuite elle donne en avant
a l'artere epigastrique qui remonte
obliquement et se termine dans la substance
du grand droit ou elle est distribuée


Ces rameaux s'anastomosent avec ceux
de la mammaire interne iliaque ensuite
l'aile échappe par d'autres branches
Ces v. se redistribue anastomose dans
l'anneau osseux lequiers des p'ties
de la genouillère dans l'un ou l'autre
sexe, elle porte le nom de fenteuse
externe la seconde est appelée
musculaire inférieure par comparaison
avec les deux dont il est le p't
elle se redistribue dans l'iliaque
ou la p'tie inférieure des muscles auxquels
les deux premiers anastomosent l'externe
iliaque vient à la surface des
pubis par la fente par laquelle pour
sortir du bas ventre et prendre en
entrant dans la cuisse le nom de
ovale dans ce passage il y a une
ou artère appelée iliaque mineure qui
donne aux muscles et aux p'ties voisines
de l'articulation de la cuisse aussi bien
que aux lequiers de ces endroits j'en
ai vu l'ovale



La Couraille au dessus de la cuisse
est tres superficielle nestons presque
couverte que des tegumens communs —
elle se trouve a la partie exterieure et
superieure de la cuisse et glisse entre
le pelvieux et la cavite du triceps
dans ce chemin elle donne plusieurs
petites artères de peu de consideracion
qui se perdent dans les tegumens —
dans les glandes des aines et dans les
muscles situes a paraville frantiers
de l'endroit de la determination cette
artere va a la partie moyenne et interieure
de la cuisse couverte d'une cuticule du
major triceps et du vaste interieure de la
elle passe a la tige du long triceps
pour arriver a la partie inferieure et posterieure.
De la cuisse elle glisse entre les
cordes du jarret formée par les tendons
des flexisseurs de la jambe dans cette
voute la couraille jette plusieurs
musculeux environ 4 ou 5 doigts
au dessous des aines il s'en de

Ce canal renferme une artère très considérable
qui s'appelle musculuse super.
et inférieure. laquelle jette
plusieurs rameaux qui donnent
aux ~~par~~ muscles de dedans et du dehors
de la partie supérieure de la cuisse
après avoir une seconde musculuse
qui s'appellera musculuse moyenne
et inter. parce qu'elle fournit
aux parties situées vers l'intérieur
de milieu de la cuisse procédant
dernier vaisseau la cruralle jette
une troisième branche acquiesce pour
donner le nom de musculuse inf.
et post. parce qu'elle se distribue
surtout aux chairs et aux parties logées
vers le bas et le derrière de la cuisse
l'artère dans son chemin surtout
vers le bas de la cuisse fournit bien
d'autres rameaux de moindre conséquence
elle en donne par exemple au contourner
ou grand post. et aux parties en venant
moy. qui se trouvent placées dans

Ces Endroits



La Cuvaille en fait parvenir
au jarret ou elle laisse échapper —
bien de branches qui se perdent dans
le voisinage mais surtout elle
jette deux ou trois de chaque côté
à qui l'on donne le nom de poplites
elles garnissent le bas des flecteurs
de la jambe le haut des extenseurs
du pied et fournissent antérieurement
de ces endroits la cuaille ensuite s'enfon-
ce dans le corps des jumeaux et dans la veine
glisse entre la dernière et les muscles qui
sont au derrière de la jambe laelle
jette les cuailles qui d'annoncer avant
des extenseurs du pied auxquelles poplites
n'ont pas fourni ces artères garnissent
encore les côtés de la jambe l'artère cuaille
à leur fournir des distributions par la
en deux grandes branches ou change de
nom la branche plus considérable
qui glisse le long du derrière de la
jambe c'est la petite tibiale postérieure.

et l'autre qui per des membranes
qui attachent le tibia et le peronne
pour se trouver au devant de la
jambe je la nomme tibiale exte.
rieure mais super. pour en la distinguer
d'une infer. qui s'appelle bas de la
tibiale poster. la tibiale exte. et
super. se perd entièrement dans les
muscles. Situés au devant de la jambe
ou sur les côtes dans les teguments de
ces endroits descendant jusque vers le
col du pied la tibiale poster. souvent
en descendant aux muscles logés au devant
de la jambe et au devant du tibia. Des
malloles elle jette une branche qui porte
les attaches du tibia et du peronne et
fait la tibiale exte. et infer. cette
artere glissent sur la mallole
exte. se distribuant à toutes les petites
situées sur le col du pied et la
face super. de tous ces doigts le
reste du tronc se trouve vers la mallole

interne parvenue en dans la
fente de la peronny ou il se dresse
en deux branches dans l'une qui va par
à la malole interne par sous la ténar
pour donner à la plante du pied
et au gros orteil son ressort par le
de sous l'autre branche qui se détourne
vers la malole extér. passe entre le cœur
extérieur et l'hipotimus pour fournir à
la plante du pied et à toutes les ptes qui
y sont logées ainsi bien que la face
infér. de trois doigts du pied qui regardent
le dehors le rameau de dessous
joignant avec ceux du de sous
cont. à la main ceux du dedans
avec ceux du dehors

DES VAISSES
Leur porte du Cœur dans
toutes les ptes du corps ne porte
par d'autres tuyaux quand à quelle
desoines la situation de ces differens

venant en appeler les artères on
leur commencent au Cœur
et finissent. Dans les p^{tes} au
contraire les veines commencent dans
les p^{tes} pour finir au Cœur
c'est à dire on a reconnu deux trors
d'artères pour p^{tes} les p^{tes} dans les
p^{tes} de l'animal on ne reconnaît
non plus que deux veines pour les
ramener

La première La p^{te} veine pulmonaire
et reprend le nom d'artère du même nom
le second et nommé veine cavee
et reprend le nom de ce détail
de veines pour éviter les
répétitions sera on a dit et l'on
que celui des artères parce qu'on
parle de veines on passera
sous silence ce qui a été dit
à l'égard des artères qui pourra
servir de modèle pour les
veines.



La laine pulmonaire comence
par une infinité des vaines dans
la substance des peumons qui
y puisent le sang pour le porter
dans de petits rameaux et ceux
là dans de plus grans qui finissent
ensemble forment le tron lequel va
aboutir au ventricule gauche du coeur
pour y degorger le sang

La veine cave descend par des vaines
aux extremités des branches de la veine
degorge le sang dans le ventricule droit
du Coeur qui se son aboutissent
à la caverne appellee dans ce fr endroit
veine cave tout court en forme par deux
autres dans luy raportent le sang des
parties super. et appelle veine cave
descendante et l'autre venant de
celuy des parties inferieures
et nomme cave ascendante luy
et l'autre tirent leur nom de la
maniere que le sang coule

dans leur calibre dans la cavité
accidentelle les g. des artères pties
et obliges de monter pour se
rendre chaque d'elles deux l'usage
en forme par d'autres qui a quelque
différence pour en l'un d'eux
et se ressemble aux artères dans
il a déjà été parlé ainsi l'on
saura seulement mention de
variété de branches la plus
considérable parce qu'on
renvoie pour le reste à ce qui
a été dit des artères qui finissent
là ou les moindres vaines en
question commencent

La cavité du ventricule d'abord
ptie par les valvules venie
ensemble et par le tronc vaine
sans pair

Elle dernière est formée par 8
vaines intercostales inf.

la dissection d'une valvule



Seuans de vaigle pour l'autre
je dir que chaque d'elles reçoit
dans son canal latéral et
deux jugulaires l'inter et
l'autre inter. la vertebrale
cervicale inter. et l'intercostale
super. pour les 3 dernières
ou renvoyé aux artères du même
nom dans les ramifications pour
seuans conduire les branches
de vaine qui se jettent dans
les tumeurs

Latérale est bati par les plies
et la capsule la première sepon
au condyle externe de l'humérus
et va par le lig du Cotte
inter. de la main et du bras.
de ces p'ties la seconde sepon
au Condyle inter. du même
et va par le lig qui vient du

Cette partie de la main en dis deçà
et de là dans des mêmes parties examine
de ces veines en veines encore bien
d'autres que l'appareil conduira par
les rameaux d'arteres de ces endroits
vers les parties du Coude il y a
canal de communication de l'une
de ces veines à l'autre réciproquement.
quelque nomme médiane axillaire
encore reçoit bien des branches
des veines entre autre la scapulaire
la sous-clavière la mammaire externe
la thyroïdique axillaire entre
dans la poitrine par l'ouverture
du Scapule non pas par la fente
ou se jette dans la sous-clavière

La jugulaire externe ramale
tout le long des sinus de la base
du crâne pour entrer dans la
sous-clavière



La jugulaire ~~et~~ interne ramale
tout le long des parties externes

veinier de la mesenterique
et de la splénique la mesenterique
est composée de la mésentérique
inter. qui se joint à l'artere
mesenterique infer. par la
racine du Colon la cilié
la racine de l'iléon et l'intestinale
inferieure

La splénique reçoit la pénétrante
la coronaire stomacale et d'autres
vaines de moindre considération. Elle
entrepris à ce nom de celles et
des ramifications de la ciliaque
la porte formée com. il vint
de la des veines intestinales
la per. et les ciliaques gemelles elle
se perd ensuite dans le foie
ou elle jette son sang qui
est repris par les vaines
de la cava et porte dans

Le tronc enlain la Cava descendante
perce le foie et le diaphragme
pour entrer dans la poitrine et
monter au niveau du Cœur
ou se joignant avec la cava
descendante elle forme de
cavités avec que l'autre
extrém de la Cava Cava

Fin De Sen
Lingologie



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and the age of the paper.

Mr. [illegible] [illegible]

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and the age of the paper.